

Vía Sublingual:

Paso 1: Colocate 4 pastillas de misoprostol debajo de la lengua. No las tragues, mantenelas debajo de la lengua por lo menos media hora, hasta que se disuelvan.

Paso 2: Pasadas 3 horas, colocate otras 4 pastillas debajo de la lengua. No las tragues, mantenelas debajo de la lengua por lo menos media hora, hasta que se disuelvan.

Paso 3: Pasadas 3 horas, colocate por tercera y última vez, otras 4 pastillas. No las tragues, mantenelas debajo de la lengua por lo menos media hora, hasta que se disuelvan.

En total te habrás colocado 12 pastillas (4 + 4 + 4).

Vía Bucal:

Paso 1: Colocate 4 pastillas de misoprostol entre la mejilla y las encías. No las tragues, mantenelas entre la mejilla y las encías por lo menos media hora, hasta que se disuelvan.

Paso 2: pasadas 3 horas, colocate otras 4 pastillas de la misma manera. No las tragues, mantenelas entre la mejilla y las encías por lo menos media hora, hasta que se disuelvan.

Paso 3: pasadas 3 horas, colocate por tercera y última vez, otras 4 pastillas. No las tragues, mantenelas entre la mejilla y las encías por lo menos media hora, hasta que se disuelvan.

En total te habrás colocado 12 pastillas (4 + 4 + 4).

— Si podés tratá de estar acompañada/de al momento de usar misoprostol. —

¿Qué vas a sentir durante el uso del misoprostol?

Es posible que sientas mareos y náuseas. Tengas vómitos, diarrea, escalofríos, dolor de panza parecido a un dolor menstrual y fiebre mientras dura el proceso. Podés tomar Ibuprofeno 400 mg. También ayuda mucho a aliviar el dolor ponerse calor en la panza o en la cintura.

IMPORTANTE: No tomes aspirina, ni antiespasmódicos, ni bebas alcohol o consumas otras sustancias.

¿Cómo saber si el aborto se completó?

El efecto puede ser inmediato o demorar varias horas. Por eso a partir de su uso vas a tener:

- Contracciones y sangrado vaginal abundante con coágulos.
- La forma más segura de saber si el aborto se completó, es realizando una ecografía entre los 7 y 14 días posteriores al inicio del tratamiento.
- Puede que el sangrado disminuya en cantidad e intensidad, pero también puede seguir durante unas horas más y varios días después del uso de la medicación.

! ¿Cuáles son los SÍNTOMAS DE ALARMA terminado el tratamiento?

- Fiebre en aumento (MÁS DE 38°).
- Desmayos, mareos, desvanecimientos.
- Dolor intenso que persiste aún con el uso de ibuprofeno.
- Olor fuerte o mal olor en el sangrado.
- Sangrado abundante (se considera hemorragia cuando por dos horas seguidas se empapan de sangre 4 toallitas).

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES



MINISTERIO DE
SALUD

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO CON MEDICACIÓN

Tenés derecho a solicitar el método anticonceptivo que mejor se adapte a tus necesidades, consultá al equipo de salud.
FECHA PRÓXIMA CONSULTA: /..... /..... , hs.



Una vez terminado el tratamiento, si tenés los **SÍNTOMAS DE ALARMA** que se describen en el interior de este folleto, dirigite al Hospital o Centro de Salud más cercano en forma urgente.

SI TENÉS MÁS DUDAS, CONSULTÁ:

LÍNEA NACIONAL DE SALUD SEXUAL **0800-222-3444**

El MISOPROSTOL es un medicamento que permite interrumpir un embarazo de forma segura. Hasta la semana 12 de gestación se puede realizar ambulatorio sin internación.

ES IMPORTANTE SABER DE CUANTAS SEMANAS ESTÁS. El uso de pastillas es más seguro y efectivo entre las semanas 7 y 12 de gestación

(Este folleto será entregado en el marco de una consulta médica)
En Hospitales y centros de salud de la Provincia, el Misoprostol se entrega GRATUITAMENTE

— Se utilizan 12 pastillas de Misoprostol 200 mcg y podés elegir una de las siguientes vías. _____

USO DE LA MEDICACIÓN

Tenés que elegir **UNA** de las **TRES** vías.
LAS VÍAS NO SE DEBEN COMBINAR.

Vía Vaginal

Paso 1: Colocate 4 pastillas de misoprostol en la vagina, introducir las bien al fondo.

Paso 2: Pasadas 3 horas, colocate por segunda vez, otras 4 pastillas.

Paso 3: Pasadas 3 horas, colocate por tercera y última vez, 4 pastillas de la misma manera.

En total te habrás colocado 12 pastillas (4 + 4 + 4).