

Llevar una alimentación saludable rica en frutas y verduras, hacer actividad física, prevenir infecciones de transmisión sexual, completar el carnet de vacunas, evitar fumar y reducir el consumo de alcohol,
NOS AYUDAN A PREVENIR EL CÁNCER.



EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO se puede prevenir, detectar, tratar y curar.



La detección temprana del cáncer salva vidas. Acercate al Centro de Salud y al hospital.

Sigamos cuidándonos

Notas:



prevencion.promocion.ipc@ms.gba.gov.ar

Informate cómo hacerlo:
Vacuna de VPH, PAP y
Test de VPH



El cáncer de cuello de útero se produce en la parte más baja del útero o matriz y afecta principalmente a mujeres y personas con cuello de útero mayores de 35 años.

Cuando algunos tipos de Virus de Papiloma Humano (VPH) producen una infección por mucho tiempo en el cuello del útero y no se detecta, puede producir cáncer.




EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO SE PUEDE PREVENIR Y CURAR.

Se previene porque:

La vacuna y el tratamiento de lesiones antes de que sean cáncer, evitan que se desarrolle la enfermedad.

Se puede curar porque:

Si el cáncer se detecta tempranamente hay tratamientos que permiten la curación.



PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Vacuna de VPH:

Previene la infección de los virus que provocan lesiones de riesgo. Se aplica a niños y niñas de 11 años con 2 dosis separadas por 6 meses.



PAP (Test de Papanicolaou):

Detecta lesiones en el cuello del útero y permite tratarlas tempranamente. Debe realizarse anualmente en mujeres y personas con cuello de útero de entre 25 y 64 años. Luego de 2 PAP anuales seguidos normales, debe repetirse a los 3 años.



Test de VPH:

Detecta la presencia de VPH y permite diagnosticar lesiones tempranamente y realizar tratamiento.

Se puede realizar por autotoma o en conjunto con el PAP a mujeres y personas

con cuello de útero de entre 30 y 64 años. Si el resultado es negativo debe repetirse a los 5 años.

