

¿Cuándo sospechar de un caso de dengue o fiebre chikungunya?



MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**



La notificación será a través de SNVS 2.0, en el marco de la vigilancia de **Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI)**



Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI)

Paciente de cualquier edad y sexo que presenta al momento de la consulta (o haya presentado en los últimos 15 días) fiebre aguda de menos de siete (7) días de duración y mialgias o cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.

¿Qué hacer frente a
casos sospechosos?

Paciente con fiebre de menos de 7 días

(sin afección de las vías aéreas superiores)
que resida o haya viajado en los últimos 14 días a un área con circulación viral de dengue con presencia del vector



2 o más de los siguientes síntomas

- Náuseas / vómitos
- Erupciones cutáneas
- Mialgias, artralgias, artritis (puede ser incapacitante)
- Cefalea / dolor retro ocular
- Petequias / prueba del torniquete positiva
- Leucopenia
- Anorexia, malestar general, diarrea, plaquetopenia



Registrar en SVNS como caso sospechoso de dengue.

Iniciar **tratamiento inmediato**.

Tomar **muestra de suero** para laboratorio.

Consulta ambulatoria (excepto: embarazo, niños, adultos mayores, obesidad, diabetes, cardiopatías u otras condiciones clínicas).

Informar sobre signos de alarma para la **consulta inmediata**.

Recomendar **abundante líquido y uso de repelente** por 5 días.

Paciente con fiebre de menos de 7 días

(sin afección de las vías aéreas superiores)
que resida o haya viajado en los últimos
14 días a un área con circulación viral de
dengue con presencia del vector



1 signo de alarma

- Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen
- Vómitos persistentes
- Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico)
- Sangrado de mucosas
- Letargo / irritabilidad
- Hipotensión postural (lipotimia)
- Hepatomegalia >2 cm
- Aumento progresivo del hematocrito



Iniciar **tratamiento inmediato**
en el sitio de atención y hospitalizar.

Evaluar posible evolución a **Dengue Grave**.

Tomar **muestra de suero** para laboratorio.

Todo paciente con inicio agudo de fiebre >38.5 C

y artraligias (habitualmente incapacitante) o artritis acompañada de dolor intenso, incapacitante que no se explica por otra condición médica, y que resida o haya viajado en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas a zonas con circulación de virus chikungunya.



Registrar en SVNS como caso sospechoso de Fiebre Chikungunya.

Iniciar **tratamiento inmediato**.

Tomar **muestra de suero** para laboratorio.



→ **Vigilancia por laboratorio**

→ En el presente escenario, sin circulación definida de un agente, la pesquisa diagnóstica **se inicia por dengue, seguido por Chikungunya y luego Zika**, acorde a los lineamientos de la Alerta Nacional.

→ Las **muestras de los pacientes sospechosos** de arbovirus, únicamente para los casos en los que corresponda su estudio por laboratorio, se enviarán a los laboratorios de la Red acompañados de la **ficha epidemiológica** y deberán estar **notificados en el SNVS 2.0** (componente laboratorial).

→ La **Red de laboratorios provincial de vigilancia** de dengue y otros arbovirus y el algoritmo de detección se actualizará de manera regular en **www.gba.gob.ar/dengue/**



- * Notificar por SNVS todo caso de **Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI)**

- * Cargar siempre:
 - **Datos sobre comorbilidades**
 - **Cuadros de dengue previos**

- * Acompañar la muestra con **ficha epidemiológica de SFAI.**

**MINISTERIO DE
SALUD**



**GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
BUENOS
AIRES**

gba.gov.ar

epidemiologia@ms.gba.gov.ar

(0221) 429 2752

**Dirección Provincial de Epidemiología,
Prevención y Promoción de la Salud**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica
y Control de Brotes

Dirección de Salud Comunitaria